

Amandine cou coupé

Nom commun : Cou coupé ou amandine cou coupé

Nom scientifique : *Amadina fasciata*

Ordre : Passériformes

Famille : Estrildidés



Origine : Afrique (sud du Sahara)

Biotope naturel : Savane, brousse, terres agricoles et alentours des villages.

Ils nichent dans des arbres ou sous les toits, des nids de tisserins ou de moineaux abandonnés.

Ils vivent en couple en période de reproduction, et parfois en très vastes bandes le reste de l'année.

Description : 12 à 13 cm de long. La tête blanc crème porte des stries noires.

Le reste du corps est panaché de crème et de brun, et des stries noires moins marquées.

Bec robuste en forme de coin de couleur gris clair. Pattes claires

Dimorphisme sexuel : Collier rouge au niveau de la gorge chez le ♂ avec une large tache foncée sur l'abdomen.

Chez les jeunes, la bande rouge est plus pâle chez les mâles.



Longévité : 6 à 8 ans.

Alimentation : ils sont **granivores**.

- Mélange de graines pour exotiques
- Graines germées
- Epis de millet
- Pâtée à l'œuf : (reproduction et mue)
- Des fruits et légumes de temps en temps.
- Nourriture animale en complément : insecte vivants ou pâtée d'insecte

Compléments alimentaires :

- Os de seiche pour le calcium
- Vitamines et sels minéraux
- Eau fraîche tous les jours
- Graviers type grit (pour les granivores)



Reproduction : Ponte de 4 à 8 œufs, couvaison de 2 semaines (12 à 14 jours) par le ♂ et la ♀. Les jeunes quittent le nid à 3 semaines (21 jours), ils sont indépendants 10 jours plus tard.

La reproduction est facile mais le couple a besoin de calme autour du nid.



Comme presque tous les oiseaux granivores, l'Amadine cou-coupé a simplement besoin de protéines animales (petits insectes, pâtée insectivore, pâtée à l'œuf, etc.) pour élever ses petits dans de bonnes conditions.

Il faut parfois un an pour que ces oiseaux nidifient après une nouvelle installation. Attention, limiter les couvées à 3 maximums par saison.

Captivité : Grande cage ou volière collective.

Il peut passer l'été en extérieur, dans une volière avec abri : on installera des branchages et des arbustes pour qu'il puisse construire son nid.

Il faut lui offrir des perchoirs naturels élevés, ainsi que des branches mortes posées au sol, une zone sableuse, une zone de terre sèche et une autre plus ou moins caillouteuse.

Il aime la chaleur et le soleil.

Il aime une baignoire où on changera l'eau chaque jour.

Caractère : Il est agréable et sociable. Il a un naturel curieux.

Il est vif et plein d'entrain.

Sons émis : Ce ne sont pas de bons chanteurs.

Il est parfois difficile de distinguer le chant du mâle lorsque l'on se tient à proximité de la volière : agréables gazouillis flûtés.

Compatibilité et sociabilité : Oiseau réputé bagarreur avec les oiseaux plus petits ou plus timides. Ils acceptent la compagnie d'autres Estrildidés de même taille, mais peuvent également être élevés en colonie uni spécifique.

Pendant la période de reproduction, ils peuvent devenir très agressifs vis à vis des autres oiseaux : éviter de les loger avec des oiseaux plus petits : cela est peut-être dû à leur bec plus puissant.

On peut les mettre par exemple avec des tisserins ou des veuves.

Remarques diverses : Il est conseillé au débutant : il est d'un entretien facile, robuste et sociable. L'acclimatation ne pose aucun problème.

Statut juridique : C'est un animal non domestique sauf pour les mutations citez ci-dessous.

- les variétés blanche, brune, collier jaune du cou-coupé (*Amadina fasciata*).

Extrait de l'arrêté du 11 Aout 2006

Mutations Les mutations pastel, opale et albinos existent chez le Cou-coupé. On trouve aussi une mutation « bande orange ou jaune » qui remplace le rouge chez le mâle.

