

Bengali rouge

Nom commun : Bengali rouge ou Bengali de Bombay

Nom scientifique : *Amandava amandava*

Ordre : Passériformes

Famille : Estrildidés

Origine : Asie Inde, Thaïlande, Chine, Cambodge, Vietnam, Laos ... etc

Biotope naturel : Marais, champs cultivés, buissons, hautes herbes,

Description : 10 cm de long.

En période nuptiale : Le mâle est très différent de la femelle, il est presque entièrement rouge vif. Les côtés de la poitrine et les flancs sont maculés de petits points blancs. Le dessous de l'œil est souvent marqué par une fine ligne de points blancs. Le manteau, le dos et les scapulaires affichent une couleur brun rougeâtre terne avec des petites taches blanches

La femelle est de couleur brune/ gris, le dessous du corps est jaune blanchâtre, les lores sont noirs, l'œil est souligné d'un trait blanc, le croupion est orangé à rouge bordeaux avec quelquefois de petits points blancs sur la couverture alaire. En période d'éclipse ou inter nuptiale, le mâle ressemble à la femelle, mais le croupion et le ventre sont d'un blanc jaune plus vif et il peut conserver quelques points blancs sur les flancs.

À la fin de la saison de reproduction, les mâles commencent à avoir un plumage qui ressemble à la coloration des femelles



Jeune mâle immature



Mâle hors période de reproduction

Plumage inter nuptiale = Plumage revêtu après la période de reproduction.

Bengali rouge

Dimorphisme sexuel : Voir description

Longévité : 6 à 8 ans.

Alimentation : Le Bengali rouge se nourrit en liberté de graines de graminées diverses dont beaucoup de millets qui forment sa nourriture principale mais cette alimentation est enrichie d'insectes surtout au moment de la reproduction.

Ils sont **granivores**.

- Mélange de graines pour exotiques
- Graines germées
- Epis de millet
- Pâtée à l'œuf : (reproduction et mue)
- Des fruits et légumes de temps en temps.
- Nourriture animale en complément : insecte vivants ou pâtée d'insecte

Compléments alimentaires :

- Os de seiche pour le calcium
- Vitamines et sels minéraux
- Eau fraîche tous les jours
- Graviers type grit (pour les granivores)



Reproduction : Assez facile dans de bonnes conditions

Le nid peut être construit dans des formes artificielles placées par l'éleveur dans des buissons ou autre végétaux de taille réduite.

Le Bengali rouge s'accommode facilement d'un nichoir semi-ouvert.

Il utilise des herbes pour nicher ou de la fibre de coco

Les petites plumes sont souvent utilisées pour l'achèvement intérieur du nid.



Une ponte normale comprend quatre à six œufs qui sont couvés durant une petite quinzaine de jours.

Bengali rouge

Les jeunes quittent le nid vers l'âge de 3 semaines, les jeunes ont une couleur semblable à la femelle, Ils prennent le plumage adulte au bout de 3 mois, mais le rouge restera moins marqué pendant 2 ans.

Nourriture vivante ou pâtée d'insectes pour la période de reproduction

Attention, limiter les couvées à 3 maximums par saison.

Captivité et compatibilité

: Grande cage ou volière.

Il craint l'humidité et le froid

Le Bengali de Bombay peut parfaitement être logé en volière commune soit intérieure soit extérieure. Il a un caractère pacifique envers les autres oiseaux et peut également s'élever en colonie.

Il affectionne les volières plantées de hautes herbes et buissons, on peut cependant le faire vivre dans une assez grande cage où, au moment de la reproduction, on pourra placer une ou deux plantes en pot, ainsi que des branches fraîches.

Il faut cependant éviter de le garder dans une trop petite cage

Caractère : Il est agréable et sociable. A mélanger avec d'autres Estrildidés mais éviter les espèces du même genre en période de reproduction pour ne pas favoriser l'hybridation

Sons émis : Le mâle a un chant est agréable

Remarques diverses : Il est conseillé au débutant : il est d'un entretien assez facile. Surtout pas dans une volière surpeuplée (mais c'est pareil pour tous les oiseaux !!!)

Statut juridique : C'est un animal non domestique

Mutations Pas de mutation connue



Fait le 17 déc. 2016