

## NONNETTE

**Nom commun** : Nonnette ou capucin nonnette

**Nom scientifique** : *Lonchura cucullata*

**Ordre** : Passériformes

**Famille** : Estrildidés



**Origine** : Afrique du Sud, du Sahara à l'Angola et au

Zimbabwe, îles Pemba, Zanzibar, Mafia, Comores, et quelques îles du golfe de Guinée.

Le capucin nonnette est l'un des petits granivores les plus répandus et les plus communs de toute l'Afrique

**Biotope naturel** : Cet oiseau peuple en abondance toutes les savanes sèches mais fréquente aussi les milieux cultivés et les abords des villages.

**Description** : De très petite taille (9 cm), il possède un plumage sombre et terne dans l'ensemble. Chez les adultes, la tête est noire et brun noirâtre jusqu'au milieu de la poitrine qui forme une large bavette ; tout le reste du dessous du corps et les côtés de la poitrine sont blanc. Les sous-caudales sont également barrées de noir et blanc. L'arrière de la tête et le dessus du corps sont bruns. Le bec est bicolore : mandibule supérieure presque noire, mandibule inférieure plus claire, grise. Les yeux sont marrons, et les pattes ont un couleur gris sombre. Chez les oiseaux plus âgés, la face est noirâtre, le reste de la tête et le dos sont d'un gris ardoisé, le dessous du corps est beige.



**Longévité** : De 8 à 10 ans.

**Dimorphisme sexuel** : La femelle est très semblable au mâle. Le bec de la femelle est souvent plus nettement conique que celui du mâle ; seul un œil exercé peut espérer les différencier sur des critères très subtils (plumage du mâle un peu plus brillant et mieux marqué, bec et tête de la femelle parfois plus fine...). Le chant du mâle peut permettre de sexer certains oiseaux.

**Reproduction** : L'accouplement a lieu dans le nid.

La ponte se compose habituellement de 4 à 6 œufs, qui sont couvés par les deux parents durant environ 12 à 15 jours. Les jeunes oiseaux s'envolent lorsqu'ils ont environ 2 à 3 semaines. Il est prudent de séparer les jeunes des parents une fois qu'ils sont autonomes, car ils pourraient être attaqués si leurs géniteurs entreprennent une deuxième couvée.

Les jeunes possèdent un plumage quasi uniforme : chez les très jeunes oiseaux, le plumage est brun beige presque uniforme, à l'exception du ventre blanchâtre et de la queue noire.

**Nid fermé comme tous les Lonchura et leur donner des matériaux de construction (fibre de coco par exemple)**

**Alimentation** :

**Alimentation : Granivores (avec compléments en fruits, légumes et insectes)**

Le mélange de graines (type exotique) de base se compose d'alpiste et de millet blanc en parts égales avec d'autres graines pour les petits bacs droits.

- Millet en grappes
- Extrudés
- Pâtée à l'œuf ou au insectes, graines germées (reproduction)
- Des légumes et des fruits tous les jours.
- Insectes de temps en temps
- Os de seiche et gravier (grit)
- Vitamines selon les besoins



**Captivité** : Réserver à cette espèce une volière de grande taille et si possible plantée. On peut les faire vivre en colonies avec d'autres Estrildidés (volière) ou dans une cage (en couple).

**Caractère** : C'est un oiseau grégaire et résistant mais qui peut se montrer agressif envers d'autres oiseaux (surtout si la cage est de petite taille)

**Sons émis :** Seul le mâle émet d'une voix faible un gazouillement rapide.

**Statut juridique :** Toutes ces espèces sont des animaux non domestiques (phénotypes sauvages et mutations).

