

CAPUCIN A TETE BLANCHE

Nom commun : capucin à tête blanche ou nonette à tête blanche

Nom scientifique : *Lonchura maja*

Ordre : Passériformes

Famille : Estrildidés



Origine : Indonésie.

Biotope naturel : Plaines, zones cultivées, prairies, jardins.

Description : 11 à 12 cm de long .

Tête blanche, queue, dos et ailes marron, le ventre est brun-noir.

Le bec est bleu clair, les pattes gris sombre.

Dimorphisme sexuel : la ♀ a souvent un plumage d'un blanc moins franc (plus terne) que le ♂, mais il est difficile d'identifier les sexes.

On peut faire le sexage en début de période de reproduction en observant le comportement : le ♂ parade avec un brin de paille dans le bec, **il chante** et il danse pour séduire la ♀.



Longévité : 6 à 8 ans.

Alimentation : ils sont principalement **granivores**.

- Mélange de graines pour exotiques (millet + alpiste + niger en petite quantité)
- Graines germées
- Epis de millet
- Extrudés
- Verdures
- Pâtée à l'œuf
- Des fruits et légumes

Compléments alimentaires :

- Os de seiche pour le calcium
- Vitamines (2 à 3 fois par mois) et sels minéraux
- Gravier type grit (pour granivores)

Bien qu'ils mangent des petits insectes vivants, ils n'en dépendent pas pour leur ration quotidienne de protéines. La verdure, plus particulièrement les graminées, doit également constituer une part importante de leur régime alimentaire.

- Eau fraîche tous les jours.

Reproduction : - Ponte de 4 à 6 œufs

- Couvaion de 2 semaines (12 à 14 jours) par le ♂ et la ♀.
- Les jeunes quittent le nid à 3 semaines (21 jours), ils sont indépendants 10 jours plus tard.

Attention : il ne faut pas déranger la femelle qui couve.

La reproduction est difficile, il faut que les oiseaux aient beaucoup de calme.

Ils n'acceptent pas les nichoirs.

Les couples préféreront construire leur propre nid (♂ et ♀), notamment s'il existe, au sein de la volière , un riche pied de bambou propre à leur fournir un abri approprié. Les nids fermés en forme de boule sont volumineux et construits à l'aide de matériaux glanés dans la volière : plumes, fibres de coco, laine, brins d'herbe, cisal, mousse. Des nids du commerce peuvent aussi convenir.



Nid de capucins

Ils ont besoins de buissons ou haute herbes et des matériaux de nidification comme des fibres de coco, herbes On peut utiliser un support comme un nid boite ou en osier qu'ils garniront à leur convenance.

En leur offrant plusieurs options pour la nidification (nichoirs et plantations), vous réduirez les risques de conflits avec les autres occupants de la volière.

Il faut parfois un an pour que ces oiseaux nidifient après une nouvelle installation.

Un **élevage en petite colonie d'une même espèce** au sein d'une volière abondamment plantée donnera les meilleurs résultats pour effectuer de la reproduction. Il existe cependant une hiérarchie bien établie à l'intérieur d'une colonie, et il arrive souvent que seuls le ou les couples dominants nidifient et se reproduisent.



Nourrissage d'un jeune

Captivité : Grande cage ou volière collective.

Il peut passer l'été en extérieur, dans une volière bien plantée avec abri ; on installera des branchages et des arbustes pour qu'il puisse construire son nid.

L'eau du bain doit être renouvelée chaque jour.



Volière sur roulette, pour l'intérieur et l'extérieure.



Cage sans pied, les dimensions doivent favoriser le vol de l'oiseau, ne pas oublier qu'il est grégaire. Convient pour isoler l'oiseau lors de la reproduction.



Une volière extérieure. Pour l'hiver, rentrer les oiseaux ou l'équiper d'abris voir d'un système de chauffage

Comme de nombreux Lonchura, ils aiment se déplacer sur le sol pour chercher de la nourriture.

Caractère : Il est grégaire, agréable et sociable et plutôt robuste. Il a un tempérament assez calme.

Il est vif et plein d'entrain et en mouvement perpétuel si on lui propose de la place.

Sons émis : le chant du mâle est discret ; la femelle ne chante pas.

Compatibilité et sociabilité : Ils acceptent la compagnie d'autres Estrildidés de même taille, ou peuvent être élevés en colonie unispécifique.

Avec d'autres Estrildidés, il existe des risques d'hybridation.

Maladies : Croissance exubérante des ongles.

La taille doit être effectuée régulièrement (2 fois par an) et avec soin.

Statut juridique : Espèces non domestiques pour phénotypes sauvages et toutes les mutations.

Remarques diverses :

Il est conseillé au débutant : il est d'un entretien facile, robuste et sociable.